



MALARIA

NØDBEHANDLING

- sådan gør du



DANSKE LÆGERS
VACCINATIONS SERVICE

Gladsaxevej 376 1 sal, 2860 Søborg | info@dlvs.dk | +45 77 99 77 99



DANSKE LÆGERS
VACCINATIONS SERVICE

Se mere på sikkerrejse.dk

Til den rejsende, som er medgivet nødbehandling mod malaria

I mange lande med malaria forekommer forfalsket medicin. Det betyder at der er risiko for at medicin mod malaria købt lokalt ikke indeholder virksomme stoffer. Derfor kan det være en god idé på rejsen at medbringe medicin til behandling af malaria købt på et dansk apotek.



For at kunne benytte nødbehandling (stand-by emergency treatment), er det vigtigt, at du medbringer et termometer på rejse til områder med malaria. Hvis du under rejsen føler, at du kunne have feber, skal du måle temperaturen.



Hvis den er over 38 °C er der tale om feber, og du skal mistænke malaria – uanset hvad du i øvrigt har af symptomer. Feber ved malaria kan være svingende, så der kan være perioder med normal temperatur.



Hvis du har feber skal du søge læge inden 24 timer, hvis det på nogen måde er muligt. Hvis du stadig er på rejsen, så ring til din rejseforsikring, som kan guide dig til en pålidelig klinik/hospital. Hvis lægen oplyser, at du har malaria, anbefales det, at du benytter den medbragte medicin.

I helt særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at nå til læge inden 24 timer, kan du vælge at tage nødbehandlingen alene på mistanken om malaria, men i så fald skal du stadig søge læge hurtigst muligt, da feber kan være tegn på andre sygdomme end malaria og derfor kræve en anden behandling.

Du skal under alle omstændigheder følge behandlingsvejledningen på pakken og orientere dig på indlægssedlen om bivirkninger og særlige forhold, herunder samtidig fødeindtagelse.



kilde:<http://www.ssi.dk/Vaccination/Rejsevaccinationer/Malaria%20noedbehandling.aspx>



Dosering:

Nødbehandling af malaria m. tbl. Malarone:

Til voksne over 40 kg: 1 pakke tabletter á 12 stk.

Dosering: 4 tabletter dagligt i 3 dage.

Må kun anvendes til lægeverificeret malaria.

Til børn: Efter vægt

Børn 5-10 kg. 2 børnetabl. (62,5 mg/25 mg) 1 gang dgl. i 3 dage.

Børn 11-20 kg. 1 tabl. (250 mg/100 mg) 1 gang dgl. i 3 dage.

Børn 20-30 kg. 2 tabl. (250 mg/100 mg) 1 gang dgl. i 3 dage.

Børn 30-40 kg. 3 tabl. (250 mg/100 mg) 1 gang dgl. i 3 dage.

Må kun anvendes til lægeverificeret malaria.



Det er vigtigt at Malarone tages sammen med et fedtholdigt måltid for at medicinen optages fra mavetarmkanalen.